# EENIGE

# MICROLEPIDOPTERA

## VAN JAVA EN KEI-EILANDEN

DOOR

W. J. A. KLUNDER VAN GIJEN.

## Hydrocampinae.

*Symphonia synophanoses*, n. sp. ♂, 19 mm.

Antennae $^2/_3$ maal zoo lang als de costaalrand der voorvleugels, geelgrijs; palpen, kop, thorax lichtgeel, glanzend; labiaalpalpen opgericht, het 2de lid met lange beharing aan de voorzijde, het eindlid met een klein driehoekig kuifje. Voor leugels ovaal; costaalrand schuin oploopend, tot op ongeveer $^3/_4$, dan een weinig afloopend; punt afgerond; achterrand nagenoeg horizontaal, aan de vleugelbasis, tegen de costa, verscheidene donkerbruine vlekjes met wit onderbroken, doch tot de vleugelpunt loopend; op $^1/_3$ eene licht bruine, verbleekende dwarslijn, tot op den achtervleugel doorloopend; op $^3/_4$ een dergelijke 2de dwarslijn, voorafgegaan door eene donker bruine stip en bij den costaalrand in eene groote donkerbruine vlek uitloopend; het laatste 4de deel des vleugels is lichtbruin en wordt ingesloten door genoemde dwarslijn en de franje;

het vertoont verscheidene donkerbruine stipjes en wordt aan het eind van voor- en achterrand, door 2 groote bruine vlekken begrensd; de punt des vleugels is tegen de franje door een donkerbruin, smal streepje begrensd; franje kort, lichtgeel; op het midden der vleugels is een rose weerschijn, terwijl tegen den achterrand op $^2/_3$ van af de basis eenige zeer licht bruine, onduidelijke vlekken zijn. Achtervleugels geel met witachtig rosen weerschijn; ook hier komen 2 lichtbruine dwarslijnen voor, doch minder bruine vlekjes; op $^1/_4$ van de basis een lichtbruine stip; tegen den achterrand 2 groote duidelijke, zwartachtige vlekken; tegen de franje een zwartbruin streepje; franje witgeel; abdomen wit glanzend; tibiae wit, bij de inplanting der sporen door schubben verdikt; de buitensporen zijn $^1/_2$ maal zoo lang als de binnensporen; dijen wit.

Verwant aan *S. multipictalis* Hampson.

Java (Soerabaja) April.

## Pyralinae.

*Proteinia cartatalis* n. sp. ♂. 42 mm.

Antennae $^1/_3$ maal de lengte van den costaalrand der voorvleugels, geelgrijs; labiaalpalpen opgericht, lang, bijna $2^1/_2$ maal langer dan de kop, eindlid $^1/_2$ maal langer dan lid 2; voorhoofd afgerond; thorax bruingeel, glad; kop geelachtig. Voorvleugels ovaal, costa gebogen, achterrand gegolfd, punt iets uitstekend, binnenrand nagenoeg horizontaal; grondkleur bruingrijs; op $^1/_4$ van den vleugelbasis 2 helderbruine vlekken; op ongeveer $^1/_2$ van de vleugellengte een roodachtigbruine dwarslijn, een driehoek vormend en tot den binnenrand loopend; tegen het eind een groote donkerbruine vlek; bij de franjelijn eene gele dwarsstreep, tegen voor- en binnenrand verbleekend en aan de zijde van den achterrand door eenen donkerbruinen smallen dwarsband begrensd; franje bruingrijs, kort. Achter-

vleugels grijsbruin, min of meer geelachtig tegen de basaalhelft; voorrand gebogen, achterrand gegolfd, binnenrand steil; grondkleur lichter bruingrijs; op $^2/_3$ van de basis eene donkerbruine dwarslijn, breed begrensd door een grijswit smaller dwarslijntje; kleur des vleugels boven deze dwarslijn donkerder grijsbruin, daaronder geelbruin; tegen den achterrand een gegolfde dwarslijn, bruingrijs met wit onderbroken en hier en daar bruine stippen op het lichter gekleurde gedeelte; franjelijn geel, franje geelgrijs, kort; abdomen grijsbruin, puntig; buik grijswit, tibiae lichtgrijs, sporen wit, de buitensporen ongeveer $1^1/_2$ maal langer dan de binnensporen; dijen witgrijs; onderzijde eenkleurig grijsgeel.

Verwant met *P. pallifrons* Snellen.

Kei-eilanden.

## Scoparinae.

*Micraglossa convatalalis* n. sp. ♂, 17 mm.

Antennae $^3/_4$ maal zoo lang als de costaalrand der voorvleugels, bruingeel; kop en thorax bruin; palpen opgericht, het 2^de^ lid lang, reikt tot het eindpunt van den kop, aan de voorzijde behaard, het eindlid puntig; voorhoofd afgerond; thorax en kop duidelijk afgescheiden; zuiger opgerold, voorvleugels met nagenoeg ongebogen costa; achterrand gebogen, binnenrand horizontaal, vleugelpunt een weinig uitstekend, kleur bruin, tegen de basis geelachtig bruin; op $^1/_2$ van de costa komen 3 donkerbruine vlekken voor, op $^1/_4$ een lichtere, op $^2/_5$ een donker veld, dat door eene lichtere dwarslijn wordt begrensd; franje lichter bruin; op $^1/_4$ van den binnenrand een bruine vlek. Achtervleugels nagenoeg ongeteekend, bruin gekleurd; abdomen bruin met donkere abdominaalringen; tibiae geel; sporen witgeel; de binnensporen zijn $^2/_3$ maal langer dan de buitensporen; dijen witachtig. Ader 3 der voorvleugels

ontspringt nog voor de middencel, 4 en 5 uit de cel, 7 vrij; middencel der achtervleugels kort, ader 3 komt daaruit, 4 en 5 vergroeid, naderhand weder vrij, 6 en 7 komen van het bovendeel der cel.

Verwant met *M. scoparialis* Warren.

Kei-eilanden.

## Pyraustinae.

*Rhynchetria* n. g.

Antennae matig lang; labiaalpalpen neerhangend, zij hebben ongeveer $^1/_2$ deel der doorsnede van de oogen, aan lengte, kort, geelbruin; het eindlid puntig; oogen groot; tibiae bij de inplanting door schubben verdikt. Voorvleugels met ader 2, uit $^2/_5$ van de middencel, 3 en 4 uit den hoek, 5 nadert 4 tegen den hoek, 6 en 7 vrij, 8 en 9 gesteeld, 10 vrij, 11 gesteeld. Achtervleugels: ader 2 uit $^2/_3$ van de middencel, 3 en 4 uit den hoek, zij naderen elkaar, 5 loopt in den hoek der middencel met 4 ineen, 6 en 7 vrij, 8 en 9 gesteeld.

Verwant met *Furcivena* Hampson.

Type *R. damasales* Kl. v. G.

*Rhynchetria damasales* n. sp. ♂, 25 mm.

Antennae geelbruin; kop, palpen, thorax, lichtgeel. Voorvleugels eenkleurig lichtgeel, glanzend, ovaal; costa weinig gebogen; achterrand nagenoeg horizontaal; achtervleugels als de voorvleugels gekleurd; tibiae lichtgeel met wit; abdomen witachtig, glanzend; dijen wit.

Java (Soerabaja) April.

## Tortricinae.

*Eulia terasana* n. sp. ♂, 18 mm.

Antennae $^2/_3$ maal zoo lang als de costaalrand der voor-

vleugels, lichtbruin, fijn bewimperd; kop vrij klein; oogen matig groot; palpen vrij lang, ongeveer 2$^1/_4$ maal langer dan de kop, bruin, horizontaal; thorax glad. Voorvleugels direct zeer breed bij de basis; costa gebogen, achterrand steil, punt vooruitstekend; binnenrand horizontaal, bij de basis sterk gebogen; tegen den costaalrand bevindt zich geen omslag; grondkleur der voorvleugels goudglanzend, bruinachtig, wortelveld bruin glanzend, begrensd tot op $^2/_5$ door een donkerder gedeelte en 2 donkerbruine dwarslijnen; 1ste lichte streep, en 2de bruin gekleurd; middenband donker goudkleurig, glanzend, met bruin; schild bruin, voorrandsvlek en voorrandshaakjes donkerbruin; franje glanzend geelachtig bruin met enkele donkere schubben tegen den achterrand. Achtervleugels lichtgeel; abdomen, tibiae en dijen geel; sporen door schubben omgeven en een weinig verdikt bij de inplanting, overigens flink gevormd, zoo ook de tibiae.

Kei-eilanden.

## Conchylinae.

*Eusanthis scardiosana* n. sp. ♂, 21 mm.

Antennae $^2/_3$ maal zoo lang als de costaalrand der voorvleugels, bruin, fijn bewimperd; zuiger kort; labiaalpalpen rechtuitstekend, naar voren verbreed; kop, thorax geel; oogen vrij groot; costa gebogen; punt stomp; achterrand gelijkmatig gebogen, $^1/_2$ maal zoo lang als de costaalrand; binnenrand tegen de vleugelbasis sterk gebogen; teekening bruin, op gele grondkleur, eenigszins afwijkend van de gewone Tortriciden-teekening; wortelveld geel, met bruin, begrensd tot op $^1/_4$ door een lichtbruine dwarslijn; 1ste lichte streep geel; middenband donkerder bruin; 2de lichte streep eveneens geel en doorkruisd met 2 lichtbruine dwarsstreepjes; voorrandsvlek donkerbruin; schild geelroodachtig met bruin; voor-

randshaakjes donkerder bruin; franje bruin, tegen den achterrand donkerder. Achtervleugels ongeteekend, licht dof geel; franje eveneens geel; tibiae dik, bij de inplanting der sporen door schubben verdikt: dijen geel; abdomen vrij slank, stomp, geel.

Kei-eilanden.

## Tinaegeriidae.

*Eretmocera thephagones* n. sp. ♀, 14 mm.

Antennae donker bruingrijs; kop en prothorax bruinachtig geel, rest van den thorax bruin; labiaalpalpen donkerbruin, opgericht, voorvleügels ovaal, naar het uiteinde min of meer puntig uitloopend, zwart en geel gekleurd; bij de basis is een geel veldje, dat ongeveer uit een $^1/_2$ deel van de lengte des vleugels bestaat, dan een zwarte dwarsband, van den costaalrand tot den achterrand loopende, waarna weder een geel veldje komt, ongeveer even breed als het 1^ste^, dat begrensd wordt door een 2^den^ zwarten dwarsband, breeder dan de 1^ste^; vleugelpunt geel; franje zwartachtig. Achtervleugels geel en zwart; zij zijn iets puntig toeloopend en op ongeveer $^2/_3$ het breedst; op het eind komt een zwarte band voor, zich tot op $^2/_3$ van de vleugellengte uitstrekkende; tibiae zwart; sporen zwart, bij hun inplanting door zwarte schubben omgeven; dijen geel met zwart; abdomen zwart, doch met een gelen abdominaalring; buik geelachtig; onderzijde als de bovenzijde gekleurd. Ader 4 en 5 der achtervleugels zijn gesteeld.

Java (Soerabaja) Maart.

## Oecophoridae.

*Hypercallia inguinaris* n. sp. ♂, 23 mm.

Antennae, thorax, kop, geelwit; labiaalpalpen donkerder

geel, opgericht, eindlid vrij puntig. Voorvleugels ovaal; costaalrand gebogen; punt afgerond; achterrand horizontaal; op ongeveer $^1/_2$ van de vleugellengte een bruine stip; bij de franje aan de vleugelpunt bruine vlekjes; franje wit, glanzend. Achtervleugels ongeteekend, zijde-glanzend, zeer licht geel; franje der voor- en achtervleugels wit; tibiae licht geel, bij de inplanting hunner sporen door schubben verdikt; abdomen witglanzend met hier en daar gele beschubbing; dijen witgeel.

Java (Soerabaja) April.

*Hypercallia cuprones* n. sp. ♂, 25 mm.

Antennae donkerbruin, zoo ook kop en thorax; labiaalpalpen zwartachtig bruin, opgericht, eindlid puntig. Voorvleugels ovaal, costaalrand gebogen; achterrand nagenoeg horizontaal; vleugelpunt afgerond; teekening komt met *inquinaris* vrij veel overeen, doch de kleur veel donkerder, koperglanzend, bruin, tegen de basis verbleekend, doch naar de vleugelpunt donkerder en met bruine beschubbing; franje geelachtig. Achtervleugels donkerder dan de voorvleugels, bij de punt het donkerst; tegen de franje bij den achterrand een smalle band van zwartbruine schubben, welke door bronskleurige begrensd worden; de geheele achtervleugel is met bronskleurige schubben bestrooid, doch de grondkleur is koperkleur; abdomen bruingeel, tegen de anaalopening lichter gekleurd; tibiae lichtgeel; sporen en dijen dito gekleurd.

Java (Soerabaja) April.